

Où trouver les critères suivants	PHIL	PIM-Check	Formulaire de soins aux personnes âgées	Critères STOPP	Critères START	Critères de BEERS	GheOP'S	Choisir avec soin	CBIP ( y compris RCP )	Drug
Indication	+++		++						+++	
Posologie	+++								+++	
Contre-indications	+++	+++		+		+	+		++	+
Le choix médicamenteux approprié		+	+++		+		+		+	
Modalités de traitement	+	+							+++	+
Interaction médicament/ médicament	+++	+++		+		+	+		++	+++
Interaction médicament/pathologie	+++	+++		+		+	+		++	
Interaction médicament/ alimentation	+++	+							++	+++
Effets indésirables	+++		+	+		+	+		+++	+
Toxicité rénale									+++	
Sous prescription		+++	+		+++		+++			
Sur prescription ( doublon par exemple )		+++	+	++		+++	+++	++		
Erreur de prescription ou mauvais choix thérapeutique	+	++	+++	++			++	+	+	+
Adapté à la situation belge	+++	++	+++	+++	+++		+++		+++	
Couper/broyer*			Renvoie au CBIP						++	
Gestion de l'interaction	+++	++					++			++
Adapté au patient âgé			+++	+++	+++	+++	+++	+	++	
Tient compte du cout/efficacité			+++							

\* Seules les indications courantes chez la personne âgée sont reprises.

+++ A utiliser en première intention : recoupe un maximum d'informations

++ A utiliser en 2ème intention : recoupe un maximum d'informations mais plus long à utiliser, ou dans certains cas moins d'informations disponibles.

+ Utiliser en dernier lieu : recoupe nettement moins d'informations

L'utilisation de tous ces outils pour un même cas n'est pas toujours nécessaire, tout dépend du résultat escompté.

Pour obtenir une révision de traitement exhaustive, il est conseillé d'utiliser au minimum 2 outils pour un même critère en privilégiant les résultats +++.