

Critère START

Si telle condition, envisager de **commencer** tel médicament.

Individualiser l'évaluation: tenir compte de l'état de santé du patient, de son espérance de vie et de ses préférences

	Si...	Commencer...
Système musculo-squelettique	Patient institutionnalisé	Vitamine D
	Ostéoporose documentée <u>Ou</u> Fracture de fragilité	Calcium Vitamine D
Système cardiovasculaire	Hypertension artérielle persistante (> 160/90 mmHg)	Antihypertenseur (à commencer ou à majorer)
	Fibrillation auriculaire chronique	Anticoagulant oral
	Insuffisance cardiaque systolique (fraction d'éjection diminuée ≤ 40%)	IECA
		β-bloquant (bisoprolol, nébivolol, métoprolol, carvedilol)
	Coronaropathie (angor, stent, infarctus)	IECA
Athérosclérose documentée (coronaire, cérébrale ou périphérique, c.-à-d. prévention cardiovasculaire secondaire)	Antiagrégant	
	Statine (si < 80 ans)	
Divers	Patient institutionnalisé	Vaccin annuel contre la grippe
	Patient recevant des opioïdes	Laxatif

Abréviations: HTA = Hypertension artérielle; IPP = Inhibiteurs de pompe à protons; NYHA = New York heart association; IECA = inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine; DHP = Dihydropyridine; AINS = Anti-inflammatoire non stéroïdien